



John Jairo Aristizábal G.
OFTALMÓLOGO - GLAUCOMATÓLOGO

INJERTO DE CORNEA
Octubre de 2006

DEFINICIÓN

- Es el cambio de una córnea alterada por múltiples circunstancias en un paciente, en la que la córnea pierde su transparencia y se coloca una córnea donante de cadáver o paciente con muerte cerebral

TIPOS DE QUERATOPLASTIA

- Penetrante: Se cambia todo el espesor de la córnea
- Lamelar: Se cambian todas las capas excepto las profundas, dejando el endotelio del paciente receptor.

INDICACIONES

- Queratocono: Adelgazamiento hereditario o adquirido de la córnea. Actualmente en aumento por las cirugía refractiva
- Cicatrización de la córnea por infecciones o lesiones severas.
- Opacidades de la córnea después de cirugía de catarata.

TECNICA QUIRÚRGICA

Anestesia general preferiblemente

Ambulatorio

La córnea se pide con antelación al Banco de ojos de la Cruz Roja o a Bancórnea

-Hay buena disponibilidad de córneas en la ciudad-

Tiempo quirúrgico aprox. de 1 hora


RECUPERACIÓN

- La recuperación visual es lenta, pero el postoperatorio es de rápida recuperación.
- El paciente debe estar mínimo 8 días en la ciudad; el postoperatorio tardío lo puede hacer en su respectiva ciudad o país


TARIFAS

- Actualmente hay tarifa integral para injerto de córnea que oscila alrededor de 2'100.000 , mas los honorarios médicos de 1'500.000, bastante competitivo a nivel internacional
- Nota: la tarifa exacta averiguarla con Gloria Paneso


Leucoma corneal




Infeccion corneal



Córnea transparente después de injerto corneal



Opacidad corneal



Examen con Lámpara de hendidura



Postoperatorio inicial

